



Promotor-L[®] 47

Levorotációs formájú aminosavak és vitaminok

Hozd ki a legtöbbet a lehetőségeidből - maximális hasznosulás!



Promotor-L[®] 47


Levorotációs formájú aminosavak és vitaminok




Könnyen emészthető aminosavak

Tartalmazza az összes szükséges aminosavat – esszenciálisat és nem esszenciálisat egyaránt – a madarak optimális fejlődéséhez. Valamennyi aminosav levorotációs formában van jelen, ami kiváló emészthetőséget biztosít.

D-aminosav



L-aminosav



Magas koncentráció

Tökéletes étrendkiegészítője a brojlercsirkék, tojótyúkok és tenyészttyúkok termelési ciklusának bizonyos szakaszaiban, mivel minden aminosav mennyisége felesleg nélkül, pontosan szabályozott.

Hígítva 1 ml / liter



Promotor L47



Hasonló termék



Hígítatlan állapotban



Promotor L47


Hasonló termék

Magas oldhatóság

Teljes mértékben oldódik, így alkalmazása egyszerűbb, és elkerülhetők a tartályokban és az itatórendszerben jelentkező problémák. Más termékek idővel kicsapódhatnak, és eltömődést okozhatnak a csövekben, szelepekben.

Magas stabilitás

Az összetétel nem tartalmaz gyorsan bomló vegyületeket, például zsírban oldódó vitaminokat, amelyek eltömődést okozhatnak az itatórendszer csöveiben. A Promotor L47 hatékonysága hosszú időn keresztül biztosított, és nem befolyásolja az ivóvíz minőségét.



Hígítatlan

Promotor 47L

1 ml / L

0,5 ml / L

Hasonló termék


Promotor L47
olajos réteg nélkül



Az összehasonlító terméknel, 24órával a kimérést követően is látható az olajos filmréteg a folyadék tetején.



TENYÉSZÁLLAT




- ➔ Kevesebb elhullás
- ➔ Egységesebb testsúly
- ➔ Fokozza a termékenységet
- ➔ Magasabb kelési arány
- ➔ Több kikelt tojás



Vizsgálat: Fajta: Ross 308, kor: 65 hetes. Alkalmazási protokoll: 1. hét (7 napig): 1 ml/l; 4., 11., 18., 25. és 32. héten: 3 napig, 0,5 ml/l adagolással. (Spanyolország)


CSIBE



Vizsgálat: 800 egynapos jércével, Hisex White vonal; 2 csoport, mindegyikben 100 madár, 4 ismétlés. (Brazília, 2012. szeptember)

- ➔ Kevesebb elhullás
- ➔ Egységesebb testsúly
- ➔ Nagyobb átalagos testsúlygyarapodás/nap.
- ➔ Magasabb vágósúly


TOJÓTYÚK



Vizsgálat: Fajta: Lohmann LSL vonal, Alkalmazási protokoll: A 18. héttől kezdődően, 4 hetente, 1 ml/l adag ivóvízben. (Kolumbia)

- ➔ Egységesebb testsúly
- ➔ Növeli a tojáshozamot
- ➔ Kevesebb elhullás
- ➔ Javítja a takarmányhasznosítást

BROJLER



Vizsgálat: Fajta: Cobb 500, Alkalmazási protokoll: 1. hét (7 napig): 1 ml/l; 15., 16., 17. és 18. nap: (a Gumboro elleni oltás előtt 2 nappal és utána 2 nappal); Adagolás: 0,5 ml/l; Vágáskori életkor: 47 nap. (Spanyolország)

- ➔ Csökkenti az FCR-t
- ➔ Jobb napi átlagos gyarapodás
- ➔ Magasabb vágósúly



Kontroll csoport



Promotor L® 47

Promotor-L® 47

Levorotációs formájú aminosavak és vitaminok



Levorotációs formájú aminosavak

1 Literben

Alanin	7,4g	Leucin	5,6g
Arginin	8,6g	Lizin	7,6g
Aszparaginsav	10,0g	Metionin	1,8g
Fenilalanin	5,8g	Prolin	11,8g
Valin	9,3g	Szerin	12g
Cisztin	4,6g	Treonin	6,2g
Glutamin	17,8g	Tirozin	3,1g
Glicin	10,3g	Triptofán	nyomokban
Hisztidin	1,5g	Hidroxiprolin	nyomokban
Isoleucin	5,6g	Nyersfehérje:	13,5-17%

Vitaminok

1 Literben

Nikotimamid	16,25g
D-pantenol	7,5g
B1-vitamin	1,75g
B2-vitamin	2,5g
B6-vitamin	1,125g
Biotin	1mg

JAVALLATOK:

- A madarak fogadásakor
- Lábadozás idején
- Táplálkozási betegségek és hiányállapotok esetén
- Szállítás alatt, a testsúlycsökkenés elkerülése érdekében

HATÁSOK:

- Javítja az állatok termelőképességét, a takarmányhasznosítási arányt és az életképességet
- **Brojlerekben és tojótyúkokban:** növeli a tojástermelés, a termékenység, a keltethetőség százalékos arányát, valamint az állomány egységességét
- Elősegíti az állomány egységességét és a standard súlyok elérését

ADAGOLÁS ÉS ALKALMAZÁS MÓDJA: Szájon át adandó oldat, ivóvízhez keverve alkalmazandó.

- Az élet első hetében: 1 ml / L , 5-7 napon keresztül
- Olyan időszakokban, amikor magas a fiziológiai igénybevétel (stressz, vakcinázás, takarmánymegvonás): 0,5-1 ml / L, 2-3 napig
- Többi állatfaj: 2 ml / 10 testtömeg-kg / nap, 4-5 napon át

CALIER

Barcelona - Spanyolország

calier.com

