

HASZNÁLATI UTASÍTÁS EGYBEN CÍMKE

Chlortet DV 200 mg/g gyógypremix sertéseknek A.U.V.
(25 kg-os zsák)

1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓNAK A NEVE ÉS CÍME

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Dunavet-B Zrt., 1126 Budapest, Dolgos u. 2. 3. ép. V/19.

A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó:

MEVET S.A.U. Polígono Industrial El Segre, p. 409, 25191 Leida, Spanyolország

2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Chlortet DV 200 mg/g gyógypremix sertéseknek A.U.V.

3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE

1 g készítmény tartalmaz:

Hatóanyag:

Klórtetraciklin (hidroklorid formájában) 200 mg

4. JAVALLAT(OK)

Sertések klórtetraciklinre érzékeny *Bordetella bronchiseptica*, *Pasteurella multocida* és *Mycoplasma hyopneumoniae* törzsek által okozott légzőszervi megbetegedéseinek gyógykezelésére.

5. ELLENJAVALLATOK

Nem alkalmazható a hatóanyaggal vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén.

Nem adható máj- és veseelégtelenség esetén. Nem alkalmazható ismert tetraciklin-rezisztencia esetén.

6. MELLÉKHATÁSOK

Vemhes és fiatal állatok kezelése nem javasolt, mivel a klórtetraciklin beépülhet a csontokba, és a fogakat elszínezhetheti a magzatokban illetve a növendék állatokban. A lehetséges mellékhatások: gyomor-bélrendszeri zavarok, fényérzékenység, allergiás reakció.

Ha súlyos nemkívánatos hatást vagy egyéb, ebben a használati utasításban nem szereplő hatásokat észlel, értesítse erről a kezelő állatorvost!

7. CÉLÁLLAT FAJ(OK)

Sertés

8-9. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD, A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT

Szájon át, a takarmányba keverve alkalmazandó.

A klórtetraciklin általános dózisa sertéseknek: 20 mg/ttkg/nap, 7 napon át.

A megfelelő adag kiszámításakor figyelembe kell venni az állatok testtömegét és takarmány-fogyasztását, amely függ az állatok klinikai állapotától.

Az állatgyógyászati készítmény adagolásának kiszámításához a következő képlet nyújt segítséget:

$$\dots \text{mg készítmény/kg takarmány} = \frac{100 \text{ mg készítmény / ttkg/nap} \times \text{kezelendő állatok átlagos testtömege [kg]}}{\text{átlagos napi takarmányfogyasztás/ állat [kg]}}$$

átlagos napi takarmányfogyasztás/ állat [kg]

Amennyiben az állatok állapotában nem következik be javulás, a diagnózist és a gyógykezelést felül kell vizsgálni.

A helyes adagolás biztosítása és az aluldozírozás elkerülése érdekében a testtömeget a lehető legpontosabban kell meghatározni. A készítmény ivóvízbe nem keverhető.


Az előírtól eltérő dózisban és eltérő ideig nem alkalmazható.

A pelletálás hőmérséklete nem lehet magasabb, mint 55°C.

10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Sertés hús és egyéb ehető szövetek:

7 nap



11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

Az elsődleges csomagolás felbontása után azonnal felhasználandó.

Takarmányban vagy pelletált takarmányban felhasználható: 30 nap.

12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)

A beteg állatok takarmányfelvétele (és ezáltal a gyógyszerbevitel) jelentősen változhat. Amennyiben az állatok nem fogyasztanak megfelelő mennyiségű takarmányt parenterális kezelést kell alkalmazni

A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések

A készítmény csak az állatokból izolált baktériumok érzékenységi vizsgálatának eredménye alapján alkalmazható. A készítmény jellemzőinek összefoglalójában (SPC) található utasításoktól eltérő módon való alkalmazása esetén növekedhet a klórtetraciklinre rezisztens baktériumok aránya, ami a keresztrezisztencia kialakulásának lehetősége miatt csökkentheti az egyéb tetraciklinekkel való kezeléseket hatékonyságát.

Figyelemmel kell kísérni az állattartó telepeken a helyes gazdálkodási gyakorlat betartását. Mivel a patogének eradikációja nem mindig lehetséges, a gyógyszeres kezelést a helyes gazdálkodási gyakorlattal, pl. a megfelelő higiénia és szellőztetés fenntartásával és a zsúfoltság elkerülésével együtt kell alkalmazni.

A készítmény csak olyan állomány kezelésére alkalmazható, amelyben a javallatban szereplő betegséget diagnosztizáltak.

Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések:

Tetraciklinekkel szembeni ismert túlérzékenység esetén kerülni kell a készítménnyel való közvetlen érintkezést. A készítmény bekeverése során kerülni kell a felporzást, és a bőrre illetve szembe kerülést, ezért megfelelő munkavédelmi felszerelés (gumikesztyű, védőruha, védőszemüveg és porszűrő álarc) viselése kötelező. A bőrre vagy szembe jutott készítményt azonnal bő vízzel le kell mosni. Munkavégzés közben enni, inni és dohányozni tilos. Amennyiben a bekeverés vagy a kezelés során allergiára utaló tünetek jelentkeznek, azonnal orvoshoz kell fordulni, bemutatva a készítmény használati utasítását.

Vemhesség, laktáció idején történő alkalmazás

A készítmény ártalmatlansága nem igazolt vemhesség és laktáció idején. Vemhesség és laktáció alatt kizárólag a kezelést végző állatorvos által elvégzett előny/kockázat elemzésnek megfelelően alkalmazható.

Gyógyszerköölcsönhatások és egyéb interakciók

Baktericid hatású antibiotikumokkal egyidejűleg nem alkalmazható.

Két vagy három értékű kationokkal (Ca, Fe, Mg, Al) való együttes alkalmazása kerülendő, mert a klórtetraciklin ezekkel a kationokkal komplexeket képezhet.

Túladagolás (tünetek, sürgősségi intézkedések, antidotumok)

Az ajánlott adagot nem szabad túllépni. Az ajánlott adag háromszorosa, vagy az ajánlott dózissal 21 napig végzett kezelés mellett sem jelentkeztek a túladagolás tünetei.

Inkompatibilitások

Kompatibilitási vizsgálatok hiányában ezt az állatgyógyászati készítményt tilos keverni más állatgyógyászati készítménnyel.

13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint a keletkező hulladékokat a helyi követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

A készítménnyel kezelt állatok trágyája 34 nap után használható fel szántóföld trágyázására.

14. A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJA

2016. május 25.

15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Vényköteles. Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra.


Állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

A hivatalos irányelveket figyelembe kell venni a gyógyszeres premixek takarmányba való keverésénél.

Kizárólag hatósági engedéllyel rendelkező takarmánykeverő üzemek keverhetik.

Kiszerezési egységek

25 kg, polietilénrel bélelt többrétegű papírzsáokban.



3.

Törzskönyvi szám
2649/1/09 MgSzH ÁTI (25 kg)

Gyártási szám

Lejárati idő

