

2019.08.06.

ZOTAL
LABORATORIOS

ARPON®

Dual

ROVARÖLŐ
ÉS FERTŐTLENÍTŐSZER



Óvintézkedésre vonatkozó P mondatok: GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA TARTANDÓ. A gőzök, permet belélegzése tilos. A használatot követően az arcot és a kezét alaposan meg kell mosni. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező. Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező. A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Elzárva tárolandó. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyeshulladék-lerakóba szállítás szükséges.

Baleset és mérgezés esetén: Tünetek: szem, bőr, nyálkahártya, légző rendszer, gyomor-bélrendszer irritációja hosszan tartó expozíció esetén marási sérülése. Hányinger, hányás, vérzés, fekély, gyomor- és nyelőcső-perforáció, szédülés, migrén, ajakzsibbadás, cianózis, nehézlégzés, túlzékonysági reakció hörgőgörcsökkel léphet fel. Súlyos mérgezésekben: kóma, görcsök, alacsony vérnyomás, kihűlés, tachikardia, központi idegrendszeri depresszió, ájulás, tüdőödéma és metabolikus acidózis.

Elsősegélynyújtás: Távolítsuk el a sérültet a veszélyzónából! Az elszennyeződött ruházatot vessük le. Szembejutáskor: legalább 15 percig tartó alapos szemöblítés. Bőrre jutás: a bőrfelületet bő vízzel és szappannal azonnal alaposan dörzsölés nélkül le kell mosni.

Lenyelés esetén: NE HÁNYTASSUNK! Szájon át ne adjunk semmit! Tartsuk a sérültet melegen és nyugodalomban, ellenőrizzük a légzését, légzésképtelenség esetén alkalmazzunk mesterséges lélegeztetést. Szükség esetén kísérjük a sérültet kórházba, ha lehetséges mutassuk meg a termék címkéjét, csomagolóanyagát. NE HAGYJUK A SÉRÜLT SZEMÉLYT EGYEDÜL! Kezelési ajánlás: lenyelés esetén endoszkópiás vizsgálat megfontolandó. Görcsök esetén: diazepam. Tünetek alapján történjen a kezelés.

HA ORVOSI SEGÍTSÉG SZÜKSÉGES TARTSUK KÉZNél A TERMÉK CÍMKÉJÉT, CSOMAGOLÓANYAGÁT, BIZTONSÁGI ADATLAPJÁT ÉS FORDULJUNK ORVOSHOZ VAGY AZ EGÉSZSÉGÜGYI TOXIKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLTATHOZ (ETTSZ): Munkaidőben (8 - 16 óra): +36 1476 6464. Ejjel-nappal, Ingyenes telefonszám: +36 80 20 11 99

Hulladékkezelés: A termék csomagolóanyagait, maradékait és hulladékait a hatályos helyi rendeltetnek megfelelően kell ártalmatlanítani.

Környezetvédelmi előírások: Akadályozzuk meg a termékek és hulladékaik, csomagolóanyagának csatornába, víztestekbe, felszíni vizekbe jutását.

Szennyezés-mentesítés: Nagy mennyiségű kiömlött anyagot inert, nem gyúlékony folyadékfelzívó anyaggal (pl. homok, föld, vermikulit) kell befedni, felitatni, összegyűjteni és a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítani.



DUNAVET



Forgalmazó: DUNAVET-B Zrt. 7020 Dunaföldvár,
Ady Endre utca 5-9.
Tel.: +36 75 542 940 honlap: www.dunavet.hu

Gyártó:

AA

Laboratorios Zotal S.L.

Ctra. Nacional 630, km. 809,
41900 Camas (Sevilla) Spanyolország
Tel.: +34 954 390 204 Fax: +34 954 395 516
Email: zotal@zotal.com honlap: www.zotal.com



Hatóanyagok:

10%	glutáraldehid (CAS-szám: 111-30-8)
7,25%	didecil-dimetil-ammonium-klorid (CAS-szám: 7173-51-5)
15,92%	alkil(C12-16)-dimetil-benzil-ammonium-klorid (CAS-szám: 68424-85-1)
15%	cipermetrin (CAS-szám: 52315-07-8)

Biocid termék típus, termékforma: PT3, PT18 termék típus folyékony koncentrátum;

Felhasználói kör: Kizárólag foglalkozósszerű

Felhasználhatóság: Vízben emulgeálható folyékony fertőtlenítő és rovarölő szer. Három hatóanyag (glutáraldehid, didecil-dimetil-ammonium-klorid, alkil(C12-16)-dimetil-benzil-ammonium-klorid) biztosít széles spektrumú baktericid, fungicid és virucid hatást. A hatóanyagok a termékben lévő felületaktív anyaggal együtt gyors és hatékony fertőtlenítést eredményez szerves anyag szennyezettség esetén is.

Cipermetrin tartalma következtében a termék **rovarölő hatású**, hatékony, a legtöbb rovar és atka ellen. Használható legyek, szünyögek, bolhák, tetvek, kullancsok, darazsak, csótányok, hangyák elpusztítására.

A termék különböző anyagcsoportokkal való kompatibilitása lehetővé teszi széleskörű felhasználását: raktárak, épületek, állattenyésztő telepek, baromfitartó telepek (broiler, tojó és keltető), nyúltenyésztő telepek, ólak és egyéb állatok elhelyezésére szolgáló létesítmények teljes fertőtlenítése és rovarmentesítése, használható gépek, berendezési tárgyak, állatokat szállító járművek, állatkórházak, rendelői (ketrecek), vágóhidak várótermei, stb. esetében is.

Antimikrobiális spektrum: Baktericid/fungicid/virucid/rovarölő hatású

Adagolás, alkalmazás, behatási idő: A készítmény nagy előnye, egy felhordással fertőtleníthetünk és rovarmentesíthetünk.

Megfelelő higiéniai körülményeket biztosíthatunk két lépésben:

1. lépés: előzetes tisztítás;

2. lépés: kezelés a termék megfelelően hígított oldatával (munkaoldat). Alkalmazás: juttassuk a munkaoldatot egyenletesen a kezelendő felületre; kézi lemosással, törléssel vagy permetezéssel (átztáras, ködszerű); mindkét felhordás mód megfelelően hatékony.

A termék használható létesítmények zárófertőtlenítésre (kődöztetés) és csizmák fertőtlenítésére is. Megfelelően hígított munkaoldatot használjunk, a behatási idő minimum: 15 perc. Bemártással történő fertőtlenítés esetén az eszközöket az előírt koncentrációjú munkaoldatban legalább 30 percig hagyjuk állni majd alaposan bő vízzel, öblítsük le, ha lehetséges, vagy permetezzük.

A munkaoldatokat mindig frissen, közvetlenül a felhasználás előtt hideg vízzel készítsük, a következők szerint:

Felületek fertőtlenítése, rovarmentesítése:

Rendszeres használat esetén:

1:300 - 1:400, azaz 35 - 25 ml ARPON DUAL/10 l víz

Erősen szennyezett felületek esetén:

1:100 - 1:50, azaz 100 - 200 ml ARPON DUAL/10 l víz

Permetezés, eszközök, edények, szállítójárművek kezelése:

1:200, azaz 50 ml ARPON DUAL/10 l víz

Csizmák kezelése: 1:100, azaz 100 ml ARPON DUAL/10 l víz

Dózis a kezelt felületől függően:

100 ml munkaoldat szükséges 1 m² nem-porózus felület kezeléséhez.

300 ml munkaoldat szükséges 1 m² porózus felület kezeléséhez. A kezelés az állatok távollétében történjen, az állatokat csak a kezelt felületek megszáradása és alapos szellőztetés után engedjük a helyiségbe.

Figyelmeztetés: A terméket ne keverje más készítményekkel!

A tárolóedény újrahasznosítása tilos.

Maradék megsemmisítése az előírásoknak megfelelően történjen.

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra!

Eltarthatóság és tárolás: Eredeti csomagolásában, hűvös helyen, hőforrástól távol.

Lejáratási idő: Gyártástól számítva 2 évig használható fel, a gyártási ideje a csomagolásban megtalálható.

Kiszerezési egységek: 1 liter műanyag flakon

Engedély száma: 11491-6/2019/JF

Szakvélemény száma: TOL/37/00169-3-/2019

Gyártási idő/gyártási tételszám: Lásd a csomagoláson.

Figyelmeztető H mondatok: Lenyelve vagy belélegezve ártalmas. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Allergiás bőrreakciót válthat ki. Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket és nehézlégzést okozhat. Légúti irritációt okozhat. Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Maró hatású a légutakra.