

DV

DUNAVET

Ebből válassz



SZARVASMARHA

DV DUNAVET

Jobban, mint mások

SZARVASMARHA TERMÉKEK

Ebből válassz!



VITAMIN- KÉSZÍTMÉNYEK

Terméknév	Összetétel	Adagolás	Csomagolás	Várakozási idő
Szájon át adható vitaminok				
Betamint oldat	250 g/l betain, 90 g/l C-vitamin, 0,5 g/l mentol	1-2 ml készítmény/liter víz	1liter és 5 liter	0 nap
Chicktonic folyékony kiegészítő takarmány	A, D, E-vitamin, B-vitamin komplex és aminosavak	1-2 ml készítmény/liter víz, 5-7 napon át	100 ml, 1 liter, 5 liter és 25 liter	0 nap
Dunavit-C 100% pulvis	100% C-vitamin, aszkorbinsav 1000 mg/g	2-5 g készítmény/állat/nap, 4-7 napon át	1 kg, 5 kg és 25 kg	0 nap
Esvex folyékony premix	10 g/100 ml E-vitamin, 50 mg/100 ml szelén	1 ml készítmény/5-10 ttkg, 1 liter készítmény/1000 l ivóvíz, 5 napig	1 liter és 5 liter	0 nap
Hepavex 200 folyékony kiegészítő takarmány	Szorbitol 200 g/l, L-karnitin 20,4 g/l, kolin-klorid 18,75 g/l, DL-metionin: 10 g/l, magnézi- um-szulfát: 10g/l.	0,5-1 ml készítmény/liter víz, 5-7 napon át	1 liter	0 nap
Invit AD3E folyékony előkeverék	100.000.000 NE A-vitamin, 20.000.000 NE D3-vitamin, 40 g E-vitamin	0,5-1 ml készítmény/10 ttkg, 3-5 napon át	1 liter	0 nap
Polivit Aminoacidus Liquido folyékony kiegészítő takarmány	B1, B2, B6, B12-vitaminok, C-vitamin, aminosavak	1-2 ml készítmény/liter víz, 5-7 napon át	5 liter	0 nap
Polivit B komplex + AD3E folyékony takarmány előkeverék	A, D, E, K3-vitamin, B-vitamin komplex, C-vitamin	Borjú: 8 ml készítmény/állat Szarvasmarha: 20 ml készítmény/ állat, legalább 5 napon át	5 liter	0 nap
Promotor 43 por alakú kiegészítő takarmány	A, D, E, K, B-vitaminok, C-vitamin, aminosavak	1 kg készítmény/tonna takarmány, 5 napon át	100 g és 1 kg	0 nap
Promotor L 47.0 folyékony kiegészítő takarmány	D3 és B-vitaminok, aminosavak	2 ml készítmény/10 ttkg/nap, 4-5 napon át	1 liter és 5 liter	0 nap
Injekciós vitaminok				
Esvex injekció A.U.V.	150 mg/ml E-vita- min, 0,5 mg/ml szelén	<u>Megelőzésre:</u> szarvasmarha, borjú: 1 ml készit- mény/25 ttkg IM; <u>Gyógykezelésre:</u> szarvasmarha, borjú: 2 ml ké- szítmény/25 ttkg IM	100 ml	0 nap
Vigophos 100 mg/ml +0,05 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák részté	Butafoszfán 100,00 mg/ml, cianokobalamin 0,05 mg/ml	5 mg butafoszfán és 2,5 µg cianokobalamin/ttkg, amely napi 5 ml készítmény/100 ttkg-nak felel meg, 24 órás időközönként három egymást kö- vető napon	100 ml	0 nap

ANTIBIOTIKUMOK

Szájon át adható antibiotikumok

Terméknév	Összetétel	Adagolás	Csomagolás	Várakozási idő
Coliplus 2.000.000 NE/ml koncentrátum belsőleges oldathoz A.U.V.	2.000.000 NE/ml kolisztin-szulfát	100.000 NE kolisztin-szulfát/ttkg, vagy 0,5 ml készítmény/10 ttkg/nap, 3-5 napon át Ajánlott a terméket két adagra osztani, ha közvetlenül a szájba adják	1 liter	1 nap
Tilmicosin Calier 250 mg/ml ivóvízbe/tejbe keveréshez A.U.V.	250 mg/ml tilmicosin	Csak tejpótlóban, 12,5 mg/ttkg naponta kétszer, 3-5 napon át, ami megfelel 1ml készítmény/20 ttkg dózisnak	1 liter	42 nap

Injekciós antibiotikumok

Terméknév	Összetétel	Adagolás	Csomagolás	Várakozási idő
Boflox 100 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák számára A.U.V.	100 mg/ml marbofloxacín	<u>Légzőszervi fertőzések:</u> 8 mg hatóanyag/ttkg/nap, 2 ml készítmény/25 ttkg/nap, egyszer IM. <u>Mycoplasma bovis:</u> 2 mg hatóanyag/ttkg/nap, 1 ml készítmény/50 ttkg/nap, 3-5 nap IM, SC (első IV). <u>Heveny mastitis:</u> 2 mg hatóanyag/ttkg/nap, 1 ml készítmény/50 ttkg/nap, 3 nap IM, SC (az első IV)	100 ml	8 mg/ttkg, IM: 3 nap, <u>tej:</u> 72 óra, 2 mg/ttkg (IV, IM, SC): 6 nap, <u>tej:</u> 36 óra
Eficur 50 mg/ml injekció szarvasmarhák részére A.U.V.	50 mg/ml ceftiofur	1 mg hatóanyag/ttkg/nap; 1 ml készítmény/50 ttkg, 3-5 napon át SC	250 ml	8 nap, <u>tej:</u> 0 nap
Enrodexil 100 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák számára A.U.V.	100 mg/ml enrofloxacin	5 mg hatóanyag/ttkg/nap; 1 ml készítmény/20 ttkg/nap, 3-5 napon át, SC vagy lassú IV	100 ml	SC: 12 nap, <u>tej:</u> 4 nap, IV: 5 nap, <u>tej:</u> 3 nap
Enrotron 50 mg/ml oldatos injekció szarvasmarha részére A.U.V.	50 mg/ml enrofloxacin	5 mg hatóanyag/ttkg/nap, 1 ml készítmény/10 ttkg/nap, 3-5 napon át, SC vagy lassú IV	100 ml	SC: 12 nap, IV: 5 nap
Florgane 300 mg/ml szuszpenziós injekció szarvasmarha részére A.U.V.	300 mg/ml florfenikol	30 mg hatóanyag/ttkg; 1 ml készítmény/10 ttkg, IM egyszer	100 ml	37 nap
Selectan 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarha részére A.U.V.	300 mg/ml florfenikol	20 mg hatóanyag/ttkg; 1 ml készítmény/15 ttkg, IM, 2 nap múlva meg kell ismételni	100 ml és 250 ml	30 nap
Tullavis 100 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák számára A.U.V.	100 mg/ml tulatromicin	Egyszeri szubkután (SC) injekció 2,5 mg tulatromicin/ttkg adagban (megfelel 1 ml/40 ttkg mennyiségnek)	100 ml	22 nap
Vetdrax 100 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák számára A.U.V.	100 mg/ml tulatromicin	Egyszeri szubkután (SC) injekció 2,5 mg tulatromicin/ttkg adagban (megfelel 1 ml/40 ttkg mennyiségnek)	100 ml	22 nap

DUNAVET
www.dunavet.hu

Jobban, mint mások

TŐGYINFÚZIÓK

Terméknév	Összetétel	Adagolás	Csomagolás	Várakozási idő
Fatroseal intramammális szuszpenzió szárazon álló tehenek számára	Bizmut-szubnitrát 2,6 g	Intramammális használatra, egy fecskendő/tőgynegyed közvetlenül a szárazra állítás előtti tejelési időszak utolsó fejését követően.	60 db	0 nap
Fatroximín DC 100 mg/5 ml intramammális kenőcs szarvasmarhák és bivalyok részére A.U.V.	Rifaximin 100 mg/5 ml	Intramammális alkalmazásra egy 5 ml-es előretöltött fecskendő teljes tartalmát kell egy tőgynegyedbe bejuttatni (megfelel 100 mg rifaximin/tőgynegyed kezelésnek). A kezelést közvetlenül az utolsó fejés után kell elvégezni.	60 db	0 nap Tej: 0 óra az ellés után, ha a szárazon állás időszaka egyenlő, vagy hosszabb, mint 35 nap. Tej: 35 nap a kezelés után, ha a szárazon állás időszaka rövidebb, mint 35 nap.
Mastinaton 750 mg/5 g intramammális gél tejelő teheneknek A.U.V.	Linkomicin 750 mg (850 mg linkomicin-hidroklorid formájában)	Intramammális alkalmazásra, egy előretöltött fecskendő/kezelendő tőgynegyed (megfelel 750 mg linkomicinnek/tőgynegyed). A kezelést 12 óránként, háromszor meg kell ismételni.	20 db	3 nap Tej: 84 óra (7 fejés)
Qivitan LC 75 mg intramammális kenőcs tejelő tehenek részére A.U.V.	Cefquinom 75 mg (88,92 mg cefquinom-szulfát formájában)	Intramammális alkalmazásra, egy fecskendő tartalmát óvatosan a tőgy fertőzött negyedébe kell fecskendezni, 12 óránként három, egymást követő fejés után.	24 db	4 nap Tej: 5 nap (120 óra)

PARAZITAELLENES KÉSZÍTMÉNYEK

Terméknév	Összetétel	Adagolás	Csomagolás	Várakozási idő
Cryptisel 0,5 mg/ml belsőleges oldat borjak számára A.U.V.	Halofuginon 0,50 mg/ml, ami megfelel 0,6086 mg/ml halofuginon-laktátnak	2 ml állatgyógyászati készítmény/10 ttkg naponta egyszer, 7 egymást követő napon keresztül.	500 ml-es (490 ml oldatot tartalmazó) flakon	13 nap
Elivec 5 mg/ml ráöntő oldat szarvasmarhák részére A.U.V.	Eprinomektin 5 mg/ml	Csak helyileg alkalmazható 1 ml/10 ttkg adagban, a készítményt a gerinc mentén a martól a faroktőig terjedő vékony sávban kell alkalmazni.	1 liter	15 nap Tej: 0 óra
Ivergen Premium L.A. oldatos injekció szarvasmarhák részére A.U.V.	1% ivermektin, azaz 10mg/ml ivermektin + MABS vivőanyag	200 µg hatóanyag/ttkg; 1 ml készítmény/50 ttkg SC. Egy kezelés elég. Az 500 kg-nál nehezebb állatoknál két helyre elosztva kell az adagot beadni.	50 ml és 500 ml	49 nap
Vetimec 10 mg/ml oldatos injekció A.U.V.	1% ivermektin, azaz 10mg/ml ivermektin	200 µg hatóanyag/ttkg; 1 ml készítmény/50 ttkg SC. Egy kezelés elég.	50 ml és 500 ml	49 nap

EGYÉB KÉSZÍTMÉNYEK

Terméknév	Összetétel	Adagolás	Csomagolás	Várakozási idő
Ainil oldatos injekció A.U.V.	100 mg/ml ketoprofen	3 mg hatóanyag/ttkg/nap; 3 ml készítmény/100 ttkg/nap, 1-3 napon át, IV, IM	50 ml	IM: 4 nap, IV: 0 nap, <u>Tej</u> : 0 nap
Animeloxan 20 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák számára A.U.V.	Meloxicám 20mg/ml	Egyszeri szubkután vagy intravénás injekció, 0,5 mg meloxicám/ttkg, azaz 2,5 ml készítmény/100 ttkg	100 ml	15 nap <u>Tej</u> : 5 nap
Aquazix E52 víztisztító-fertőtlenítőszer	50% hidrogén-peroxid, stabilizátor	<u>Vezeték rendszer</u> : 1 liter készítmény/100 liter víz, <u>ivóvízbe folyamatosan</u> : 10-30 ml készítmény/1 000 liter víz	20 liter	0 nap
Boviestimul kiegészítő takarmány szarvasmarhák részére	4x10 ¹¹ CFU <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , 525 mg kobalt, 30 g DL-metionin, 5 g L-lizin/kg	3 kg készítmény/tonna takarmány	500 g	0 nap
Calciovet oldatos injekció A.U.V.	190 mg/ml kalcium-glükonát, 45 mg/ml kalcium-glükóheptonát, 10 mg/ml kalcium-d-szacharát, 60 mg/ml magnézium-klorid-hexahidrát, 30 mg/ml nátrium-hipofoszfát	200-400 ml készítmény/állat IM, lassú IV	500 ml	0 nap
Fintox Maxi takarmány adalékanyag előkeverék	Sepiolit, bentonit, betain, L-karnitin	1-2,5 kg készítmény/tonna takarmány	25 kg	0 nap
Fintox Pro Advance takarmány adalékanyag előkeverék	Sepiolit, bentonit, betain, MOS, enzimek, articsóka kivonat, tengeri hínár liszt	1-2 kg készítmény/tonna takarmány	25 kg	0 nap
Glucosal különleges táplálási igényeket kielégítő, diétás kiegészítő takarmány borjak részére	81,7% dextróz, 10% NaCl, 5% nátrium-citrát, 1% KCl, 0,3% CaCl ₂	10-30 g készítmény/liter ivóvíz; 50 g készítmény/kg takarmány, 1-7 napon át	100 g	0 nap
Litazix alomfertőtlenítő-és szárító állatgyógyászati ápolószer	85% kalcium-karbonát, 14% mikronizált fűrészpor, 0,5% eukaliptusz olaj, 0,5% szintetikus kámfor	<u>Tejelő istálló</u> : 300 g készítmény/állat hetente 3x, <u>kötött tartás</u> : 130 g készítmény/állat/nap, <u>borjú istálló</u> : 80 mg készítmény/m ² hetente 3x, <u>Steinmann ketrec</u> : 60 g készítmény/állat/nap	25 kg	0 nap
Niglumine 50 mg/ml oldatos injekció szarvasmarha részére A.U.V.	50 mg/ml flunixin	2,2 mg hatóanyag/ttkg/nap; 2 ml készítmény/45 ttkg/nap IV, 24 óránként, maximum 3 napon át	100 ml	4 nap <u>Tej</u> : 24 óra
Nutrivet Nature különleges táplálási igényeket kielégítő, diétás kiegészítő takarmány borjak részére	Vitaminok, ásványi anyagok, elektrolitok, szénhidrátok	Borjú: 100 g készítmény/1,5 l meleg ivóvíz vagy tej, reggel és este 1-7 napon át	100 g	0 nap
Orondo spray A.U.V. szarvasmarha külső sérüléseinek kezelésére	20 mg klórtetraciklin/ml	Külsőlegesen alkalmazandó!	250 ml	0 nap
Oxyvet injekció A.U.V.	10 NE/ml oxitocin	<u>Ellés megindítására</u> : 5-10 ml készítmény/állat IM, SC, <u>tejelválasztás megindítására</u> : 1-2 ml készítmény/állat IM, SC, ha szükséges, 30 perc múlva ismételtető	250 ml	0 nap
Partovet injekció A.U.V.	10 NE/ml oxitocin	5-7 ml készítmény/állat, SC, IM, ha szükséges, 30 perc múlva ismételtető	100 ml	0 nap
Penethaone 236,3 mg/ml por és oldószer szuszpenziós injekcióhoz, szarvasmarhák számára	1 ml felhasználásra kész szuszpenzió tartalmaz: 250 000 NE penetamát-hidrojodid. Por és oldószer szuszpenziós injekcióhoz	15 000 NE (14,2 mg) penetamát-hidrojodid/ttkg/nap (megfelel 6 ml feloldott készítménynek/100 ttkg) 24 óránként 3-4 egymást követő napon át.	100.000 NE porampulla és 36 ml oldószer	4 nap <u>Tej</u> : 2,5 nap (60 óra)
Utertab 2000 mg méhtabletta szarvasmarhák részére A.U.V.	Tetraciklin-hidroklorid 2000,0 mg (amely 1848,2 mg tetraciklinnek felel meg) tablettánként	1 db tablett/tehen/nap, a kezelés 1-2 naponta ismételtető, a kezelése száma maximum 3 lehet	100 db	10 nap <u>Tej</u> : 96 óra
Veteglan oldatos injekció A.U.V.	75 µg/ml d-kloprosztenol	<u>Tejelő tehenek</u> : 2 ml készítmény/állat/nap IM, <u>üszök</u> : 1 ml készítmény/állat/nap IM	20 ml	1 nap <u>Tej</u> : 0 nap

SZARVASMARHA TERMÉKEK

Ebből válassz!



VAKGINÁK

Terméknév	Összetétel	Adagolás	Csomagolás	Vára- kozási idő
Hiprabovis IBR Marker Live liofilizátum és oldószer szuszpenziós injekcióhoz	Élő, gE ⁻ , tk ⁻ , dupla géndeléciós 1-es típusú szarvasmarha herpesz vírus (BHV-1) CEDDEL törzs	3 hónapos kortól: 2 ml/állat mélyen IM, a nyaki izomzatba. 3 hét múlva ismételni. Újraoltás: 6 havonta	5 adag és 25 adag	0 nap
Hiprabovis Somni/Lkt vakcina A.U.V. emulziós injekció	<i>Mannheimia haemolytica</i> A biotípus, A1 szerotípus leukotoxoid tartalmú inaktivált, sejtmentes szuszpenzió, inaktivált <i>Histophilus somni</i> Bailie törzs	2 hónapos kortól, 2 ml/állat SC nyakba 21 nap múlva ismételni. A második adag befecskendezése az előzővel ellentétes oldalon javasolt.	10 adag	0 nap
Nasym liofilizátum és oldószer szuszpenziós injekcióhoz vagy orrsprayhez	Élő attenuált szarvasmarha járványos köhögése vírus (<i>Bovine respiratory syncytial virus</i> BRSV) LYM-56 törzs Liofilizátum és oldószer	<u>Borjak 9 napos kortól:</u> Alapimmunizálás (nazális alkalmazás): Permetezzen 1-1 ml-t mindkét orlyukba. <u>Újraoltás:</u> Egy intramusculáris injekcióban 2 ml-t kell beadni 2 hónappal az első vakcinázás után, majd 6 hónaponként ismételni. <u>Borjak 10 hetes kortól:</u> Alapimmunizálás (IM injekció): Egy IM injekcióban 2 ml-t kell beadni, majd egy második 2 ml-es IM injekciót 4 héttel később. <u>Újraoltás:</u> Egy IM injekcióban 2 ml-t kell beadni 6 hónappal az alapimmunizálás befejezését követően, majd ezt az utolsó újraoltástól számított 6 hónaponként ismételni.	5 adag	0 nap
Startvac emulziós injekció	Inaktivált <i>E. coli</i> J5 törzs, <i>Staphylococcus aureus</i> (CP8) SP 140 törzs, váladékhoz társult antigén komplex (SAAC)	2 ml/tehén 3x IM a nyak egyik majd másik oldalába felváltva: az ellés előtt 45 nappal, majd 1 hónap múlva, de legkevesebb 10 nappal a borjazás előtt, majd ellés után 52 nappal	20 x 1 adag és 1 x 25 adag	0 nap
UBAC emulziós injekció	<i>Streptococcus uberis</i> , 5616-os törzs biofilm adhéziós komponenséből (BAC) származó lipoteicholsav (LTA)	2 ml/tehén 3x IM, az ellési idő előtt 60 nappal és 21 nappal, ellés után 15 nappal	25 adag	0 nap

DUNAVET
www.dunavet.hu

DUNAVET

Jobban, mint mások