


DV

DUNAVET

Ebből válassz



SERTÉS

DV DUNAVET

Jobban, mint mások

SERTÉS TERMÉKEK

Ebből válassz!



VITAMIN- KÉSZÍTMÉNYEK

Szájon át adható vitaminok

Terméknév	Összetétel	Adagolás	Csomagolás	Várakozási idő
Betamint oldat	250 g/l betain, 90 g/l C-vitamin, 0,5 g/l mentol	1-2 ml készítmény/liter víz	1 liter és 5 liter	0 nap
Chicktonic folyékony kiegészítő takarmány	A, D, E-vitamin, B-vitamin komplex és aminosavak	1-2 ml készítmény/liter víz, 5-7 napon át	100 ml, 1 liter, 5 liter és 25 liter	0 nap
Dunavit-C 100% pulvis	100% C-vitamin, aszkorbinsav 1000 mg/g	1-2 g készítmény/állat/nap, 4-7 napon át	1 kg, 5 kg és 25 kg	0 nap
Esvex folyékony premix	10 g/100 ml E-vitamin, 50 mg/100 ml szelén	1 ml készítmény/5-10 ttkg, vagy 1 liter készítmény/1000 liter ivóvíz, vagy 2 liter készítmény/tonna takarmány, 5 napig	1 liter és 5 liter	0 nap
Hepavex 200 folyékony kiegészítő takarmány	Szorbitol 200 g/l, L-karnitin 20,4 g/l, kolin-klorid 18,75 g/l, DL-metionin: 10 g/l, magnézium-szulfát: 10g/l	0,5-1 ml készítmény/liter víz, 5-7 napon át	1 liter	0 nap
Invit AD3E folyékony előkeverék	100.000.000 NE A-vitamin, 20.000.000 NE D3-vitamin, 40 g E-vitamin	0,5-1 ml készítmény/10 ttkg, 3-5 napon át	1 liter	0 nap
Polivit Aminoacidos Liquido folyékony kiegészítő takarmány	B1, B2, B6, B12-vitaminok, C-vitamin, aminosavak	1-2 ml készítmény/liter víz, 5-7 napon át	5 liter	0 nap
Polivit B komplex + AD3E folyékony takarmány előkeverék	A, D, E, K3-vitamin, B-vitamin komplex, C-vitamin	<u>Malac:</u> 4 ml/állat <u>Koca és kanok:</u> 10 ml/állat legalább 5 napon át	5 liter	0 nap
Promotor 43 por alakú kiegészítő takarmány	A, D, E, K, B-vitaminok, C-vitamin, aminosavak	5 g készítmény/10 ttkg, 1 kg készítmény/tonna takarmány, 5 napig	100 g és 1 kg	0 nap
Promotor L 47.0 folyékony kiegészítő takarmány	D3 és B-vitaminok, aminosavak	2 ml készítmény/10 ttkg/nap, 4-5 napon át, naponta friss oldattal	1 liter és 5 liter	0 nap

Injekciós vitaminok

Terméknév	Összetétel	Adagolás	Csomagolás	Várakozási idő
Esvex injekció A.U.V.	150 mg/ml E-vitamin, 0,5 mg/ml szelén	<u>Kezelés:</u> 1 ml készítmény/25 ttkg; <u>Reprodukciós zavarok:</u> 5 ml készítmény/100 ttkg SC	100 ml	0 nap
Uniferon 200 mg/ml oldatos injekció malacok részére A.U.V.	200 mg/ml vas (III) dextránt (vas-dextrán)	<u>Megelőzésre:</u> 1-4 napos korban 1 ml készítményt kell SC, vagy a hátsó lábba mélyen az izomba beadni. <u>Kezelésre:</u> 1 ml készítményt kell SC, vagy a hátsó lábba mélyen az izomba beadni.	200 ml	0 nap

ANTIBIOTIKUMOK

Szájon át adható

Terméknév	Összetétel	Adagolás	Csomagolás	Várakozási idő
Aivlosin 625 mg/g granulátum ivóvízbe keveréshez sertések részére	62,5% (625 mg/g) tilvalozin	5-10 mg hatóanyag/ttkg/nap, 5 napon át	160 g és 400 g	2 nap
Amotrix 800 mg/g por ivóvízbe keveréshez sertések részére A.U.V.	80% (800 mg/g) amoxicillin-trihidrát	20 mg hatóanyag/ttkg/nap; 28,7 mg készítmény/ttkg/nap, 5 napon át	1 kg	9 nap
Coliplus 2.000.000 NE/ml koncentrátum belsőleges oldathoz sertések számára A.U.V.	2.000.000 NE/ml kolisztin-szulfát	100.000 NE kolisztin-szulfát/ttkg, vagy 0,5 ml/10 ttkg/nap, 3-5 napon át. Ajánlott a terméket két adagra osztani, ha közvetlenül a szájba adják	1 liter	1 nap
Ocnil 400 mg/g por ivóvízbe keveréshez sertések részére A.U.V.	Linkomicin 400 mg (ami megfelel 450 mg linkomicin-hidrokloridnak)	10 mg linkomicin/ttkg (megfelel 25 mg készítménynek ttkg-ként), 21 egymást követő napon át	1 kg	1 nap
Powdox 500 mg/g por ivóvízbe keveréshez sertések részére A.U.V.	580 mg/g doxiciklin-hiklát	23,1 mg hatóanyag/ttkg/nap; 40 mg készítmény/ttkg/nap, 5 napon át	1 kg	4 nap
Rhemox 500 mg/g por ivóvízbe keveréshez sertések számára	500 mg/g amoxicillin-trihidrát	24 óránként 20 mg amoxicillin-trihidrát (ami megfelel 17,4 mg amoxicillinnek ttkg-onként, ami megfelel napi 40 mg készítménynek ttkg-onként), 4 napon át	1 kg	6 nap
Tiatrix 450 mg/g por ivóvízbe keveréshez sertések részére A.U.V.	450 mg/g tiamulin	10 mg tiamulin-hidrogén-fumarát/ttkg/nap, azaz 22,2 mg Tiatrix 450 mg/g készítmény/ttkg/nap. A kezelés időtartama 5 nap.	1 kg, 5 kg és 10 kg	10 nap
Tilmicosin Calier 250 mg/ml ivóvízbe/tejbe keveréshez A.U.V.	250 mg/ml tilmicosin (foszfát formájában)	15-20 mg hatóanyag/ttkg/nap, 5 napon át	1 liter	14 nap

VAKCINÁK

Terméknév	Összetétel	Adagolás	Csomagolás	Várakozási idő
Eryseng szuszpenziós injekció sertéseknek	Inaktivált <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i> R32E11 törzs, alumínium-hidroxid, ginzeng	2 ml/állat IM	50 adag	0 nap
Eryseng Parvo szuszpenziós injekció sertéseknek	Inaktivált sertés parvovírus NADL-2 törzs; inaktivált <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i> R32E11 törzs; alumínium-hidroxid, ginzeng	2 ml/állat IM	10 adag és 50 adag	0 nap
Mhysphere PCV ID emulziós injekció sertéseknek	Inaktivált rekombináns <i>Mycoplasma hyopneumoniae</i> ^{cpPCV2} , Nexhyon törzs: • <i>Mycoplasma hyopneumoniae</i> ; • 2-es típusú sertés circovirus (PCV2) kapszid fehérje	0,2 ml/malac ID 21 napos kortól	50 adag és 125 adag	0 nap
Rhiniseng szuszpenzió injekcióhoz sertéseknek	Inaktivált <i>Bordetella bronchiseptica</i> 833CER törzs; <i>Pasteurella multocida</i> rekombináns D-típusú toxin; alumínium-hidroxid gél, DEAE-dextrán, ginzeng	2 ml/állat IM	50 adag	0 nap
Suiseng vakcina A.U.V. szuszpenziós injekció sertések részére	<i>E. coli</i> F4ab, F4ac, F5, F6 fimbriális adhezín, LT enterotoxoid; C típusú <i>Clostridium perfringens</i> béta-toxoid; B típusú <i>Clostridium novyi</i> alfa toxoid; alumínium-hidroxid gél, ginzeng kivonat, benzil-alkohol	2 ml/állat IM	10 adag és 50 adag	0 nap
Suiseng DIFF/A vakcina A.U.V. szuszpenziós injekció sertések részére	<i>Clostridioides difficile</i> , A toxoid <i>Clostridioides difficile</i> , B toxoid <i>Clostridium perfringens</i> , A típus, a-toxoid	2 ml/állat IM	25 adag és 50 adag	0 nap
Vepured szuszpenziós injekció sertéseknek	<i>E. coli</i> rekombináns 2e verotoxin	1 ml/állat IM 2 napos kortól	50 adag és 100 adag	0 nap

INJEKCIÓS ANTIBIOTIKUMOK

Terméknév	Összetétel	Adagolás	Csomagolás	Várakozási idő
Boflox 100 mg/ml oldatos injekció sertések számára A.U.V.	100 mg/ml marbofloxacin	2 mg hatóanyag/ttkg/nap, 1 ml készítmény/50 ttkg/nap IM, 3 napon át	100 ml	4 nap
Eficur 50 mg/ml injekció sertések részére A.U.V.	50 mg/ml ceftiofur	3 mg hatóanyag/ttkg/nap, 1 ml készítmény/16 ttkg/nap IM, 3 napon át	250 ml	5 nap
Enrodexil 100 mg/ml oldatos injekció sertések számára A.U.V.	100 mg/ml enrofloxacin	2,5 mg hatóanyag/ttkg/nap, 0,5 ml készítmény/20 ttkg/nap IM, 3 napon át; <u>emésztőszervi megbetegedések vagy E. coli szeptikémia:</u> 5 mg hatóanyag/ttkg/nap, 1 ml készítmény/20 ttkg/nap IM, 3 napon át	100 ml	13 nap
Enrotron 50 mg/ml injekció sertés részére A.U.V.	50 mg/ml enrofloxacin	2,5 mg hatóanyag/nap, 0,5 ml készítmény/10 ttkg/nap IM, 3 napon át; <u>emésztőszervi megbetegedések vagy E. coli szeptikémia:</u> 5 mg hatóanyag/ttkg/nap, 1 ml készítmény/10 ttkg/nap IM, 3 napon át	100 ml	13 nap
Florgane 300 mg/ml szuszpenziós injekció sertés részére A.U.V.	300 mg/ml florfenikol	22,5 mg hatóanyag/ttkg; 0,75 ml készítmény/10 ttkg, egyszer IM	100 ml	22 nap
Gentamox injekció A.U.V.	150 mg/ml amoxicillin, 40 mg/ml gentamicin	1 ml készítmény/10 ttkg/nap IM, 3 napon át	100 ml	75 nap
Selectan 300 mg/ml oldatos injekció sertések részére A.U.V.	300 mg/ml florfenikol	15 mg hatóanyag/ttkg/nap; 1 ml készítmény/20 ttkg/nap IM, 2 nap múlva ismételni	100 ml és 250 ml	18 nap
Tullavis 25 mg/ml oldatos injekció sertések számára A.U.V.	25 mg/ml tularomicin	Egyszeri IM injekció a nyaktájékon beadva, 2,5 mg tularomicin/ttkg adagban (megfelel 1 ml készítmény/10 ttkg mennyiségnek).	100 ml	13 nap
Tullavis 100 mg/ml oldatos injekció sertések számára A.U.V.	100 mg/ml tularomicin	Egyszeri IM injekció a nyaktájékon beadva, 2,5 mg tularomicin/ttkg adagban (megfelel 1 ml készítmény/40 ttkg mennyiségnek).	100 ml	13 nap
Vetdrax 100 mg/ml oldatos injekció sertések számára A.U.V.	100 mg/ml tularomicin	Egyszeri IM injekció a nyaktájékon beadva, 2,5 mg tularomicin/ttkg adagban (megfelel 1 ml készítmény/40 ttkg mennyiségnek) Az egy helyre beadott mennyiség max. 2ml lehet.	100 ml	13 nap

PARAZITAELENES KÉSZÍTMÉNYEK

Terméknév	Összetétel	Adagolás	Csomagolás	Várakozási idő
Espacox 50 mg/ml belsőleges szuszpenzió sertések részére A.U.V.	50 mg/ml toltrazuril	3-5 napos korban egyszeri 20 mg hatóanyag/ttkg; 0,4 ml készítmény/ttkg	1 liter	73 nap
Flubenzim 50 mg/g gyógypremix sertések részére A.U.V.	50 mg/g flubendazol	1,2 mg hatóanyag/ttkg/nap; 600 g/tonna takarmány, 7-10 napon át	25 kg	15 nap
Ivergen Premium L.A. oldatos injekció sertések részére A.U.V.	1% ivermektin, azaz 10 mg/ml ivermektin + MABS vívőanyag	1,5 ml készítmény/50 ttkg SC, 1 kezelés elegendő	50 ml és 500 ml	21 nap
Vetimec 6 mg/g gyógypremix sertések részére	6 mg/g ivermektin	0,1 mg hatóanyag/ttkg, 7 napon át; <u>növendék:</u> 0,333-0,4 kg/tonna takarmány; <u>koçák:</u> 1-1,67 kg/tonna takarmány	5 kg	12 nap
Vetimec 10 mg/ml oldatos injekció A.U.V.	1% ivermektin, azaz 10 mg/ml ivermektin	300 µg hatóanyag/ttkg; 1,5 ml készítmény/50 ttkg; <u>16 kg-nál kisebb malacok:</u> 0,1 ml készítmény/3 ttkg SC	50 ml és 500 ml	28 nap
Zorabel 50 mg/ml belsőleges szuszpenzió sertéseknek A.U.V.	50 mg/ml toltrazuril	3-5 napos korban egyszeri 20 mg hatóanyag/ttkg; 0,4 ml készítmény/ttkg	250 ml és 1 liter	73 nap

EGYÉB KÉSZÍTMÉNYEK

Terméknév	Összetétel	Adagolás	Csomagolás	Várakozási idő
Adizox+ mikrokapszulázott cink-oxid tartalmú takarmány előkeverék	Cink-oxid: 50%, kalcium-formiát (feed grade), fokhagyma (Allium-félék) kivonata, karvakrol, hidrogenizált növényi olaj (vivőanyag) nátrium-butiráttal bevont, nanoméretű cink-oxid (ZnO) szemcsék	0,3 kg készítmény/tonna takarmány	10 kg	0 nap
Animeloxan 20 mg/ml oldatos injekció sertések számára A.U.V.	Meloxicám 20mg/ml	Egyszeri IM injekció, 0,4 mg meloxicám/ttkg (azaz 2,0 ml készítmény/100 ttkg), 24 óra múlva ismételhető, eltérő helyen.	100 ml	8 nap
Aquazix E52 víztisztító-fertőtlenítőszer	50% hidrogén-peroxid, stabilizátor	<u>Vezeték rendszer:</u> 1 liter készítmény/100 liter víz; <u>ivóvízbe folyamatosan:</u> 10-30 ml készítmény/1000 liter víz	20 liter	0 nap
Aviacid Liquid takarmány előkeverék gazdasági haszonállatok részére	Propionsav (E280), hangyasav (E236), ecetsav (E260), almasav (E296), citromsav (E330), tejsav (E270), foszforsav (E338), szorbinsav (E200)	0,5-3 kg/1000 liter ivóvíz	25 kg	0 nap
Energyn kiegészítő takarmány gél újszülött malacok részére	Zsírsavak, kókusz olaj, szója olaj, A, D és E-vitaminok	1 nyomás, azaz 2 ml készítmény/malac/nap, egyszer az élet első 2 napján	6x100ml	0 nap
Fintox Maxi takarmány adalékanyag előkeverék	Sepiolit, bentonit, betain, L-karnitin	1-2,5 kg készítmény/tonna takarmány	25 kg	0 nap
Fintox Pro Advance takarmány adalékanyag előkeverék	Sepiolit, bentonit, betain, MOS, enzimek, articsóka kivonat, tengeri hínár liszt	1-2 kg készítmény/tonna takarmány	25 kg	0 nap
Gestavet injekció sertések részére A.U.V.	400 NE/5 ml PMSG, 200 NE/5 ml HCG	5 ml készítmény/állat IM, SC, 8 hónapos kortól	5 x 1 adag	0 nap
Glucosal különleges táplálási igényeket kielégítő, diétás kiegészítő takarmány malacok részére	81,7% dextróz, 10% NaCl, 5% nátrium-citrát, 1% KCl, 0,3% CaCl ₂	10-30 g készítmény/liter ivóvíz, 50 g készítmény/kg takarmány, 1-7 napon át	100 g	0 nap
Litazix alomfertőtlenítőszer állatgyógyászati ápolószer	85% kalcium-karbonát, 14% mikronizált fűrészpor, 0,5% eukaliptusz olaj, 0,5% szintetikus kámfor	50 g/malac, közvetlenül a malacra rászórva; <u>istálló:</u> 80 mg készítmény/m ² , hetente 3 alkalommal	25 kg	0 nap
Niglumine 50 mg/ml oldatos injekció sertés részére A.U.V.	50 mg/ml flunixin	2,2 mg hatóanyag/ttkg/nap, 2 ml készítmény/45 ttkg/nap IM, 12 óránként, maximum 2 alkalommal	100 ml	28 nap
Oxyvet injekció A.U.V.	10 NE/ml oxitocin	<u>Ellés megindítására:</u> 3-5 ml készítmény/állat; <u>tejelválasztás megindítására:</u> 0,5-2 ml készítmény/állat	250 ml	0 nap
Partovet injekció A.U.V.	10 NE/ml oxitocin	3-5 ml készítmény/állat, szükség esetén 30 perc múlva ismételhető	100 ml	0 nap
Suifertil 4 mg/ml belsőleges oldat sertések részére A.U.V.	4 mg/ml altrenogeszt	20 mg hatóanyag/állat/nap, 5 ml készítmény/állat/nap, 18 napon át	1000 ml	9 nap
Veteglan oldatos injekció A.U.V.	75 µg/ml d-kloprosztenol	75 µg hatóanyag/állat, 1 ml készítmény/állat IM	20 ml	1 nap
Virox fertőtlenítő por	Pentakálium-monoperszulfát, (KPMs, hármassó)	<u>Általános fertőtlenítésre:</u> 5 g termék/1 liter víz (0,5% oldat). <u>Súlyos szennyeződéskor:</u> 10 g/1 liter víz (1% -os oldat). <u>Ajánlott adagolás:</u> 200-300 ml munkaoldat/m ² terület. <u>Légtérhez:</u> 1 liter oldat/m ³ .	5 kg	0 nap

SERTÉS TERMÉKEK

Ebből válassz!



GYÓGYPREMIXEK

Terméknév	Összetétel	Adagolás	Csomagolás	Várakozási idő
Aivlosin 42,5 mg/g belsőleges por sertések részére	42,5 mg/g tilvalozin	<u>Enzooziás pneumonia</u> : 2,125 mg hatóanyag/ttkg/nap, 7 napon át; <u>proliferatív enteropátia</u> : 4,25 mg hatóanyag/ttkg, 10 napon át; <u>sertésdizentéria</u> : 4,25 mg hatóanyag/ttkg, 10 napon át	500 g	2 nap
Aivlosin 42,5 mg/g gyógypremix sertések részére	42,5 mg/g tilvalozin	<u>Mycoplasma pneumonia</u> : 2,125 mg hatóanyag/ttkg/nap, 1 kg készítmény/tonna takarmány, 7 napon át; <u>proliferatív enteropátia</u> : 4,25 mg hatóanyag/ttkg, 2 kg készítmény/tonna takarmány, 10 napon át; <u>sertésdizentéria</u> : 4,25 mg hatóanyag/ttkg, 2 kg készítmény/tonna takarmány, 10 napon át	20 kg	2 nap
Doxyprex 100 mg/g gyógypremix sertéseknek A.U.V.	10% (100 mg/g) védett (BMP) doxiciklin	10 mg hatóanyag/ttkg/nap, 2,5 kg készítmény/tonna takarmány, 7 napon át	25 kg	7 nap
Lincotrix 800 mg/g gyógypremix sertések részére A.U.V.	80% (800mg/g) linkomicin	<u>Sertésdizentéria</u> : 110 mg hatóanyag/kg takarmány, 137,5 mg készítmény/kg takarmány, 3 héten át; <u>Mycoplasma pneumonia</u> : 220 mg hatóanyag/kg takarmány, 275 mg készítmény/kg takarmány, 3 héten át; <u>proliferatív ileitis</u> : 220 mg hatóanyag/kg takarmány, 275 mg készítmény/kg takarmány, 3 héten át	1 kg	5 nap
Oxitrix 800 mg/g gyógypremix sertések részére A.U.V.	80% (800mg/g) oxitetraciklin	40 mg hatóanyag/ttkg/nap, 50 mg készítmény/ttkg/nap, 5 napon át	20 kg	10 nap
Rhemox premix 100 mg/g gyógypremix sertések részére A.U.V.	100 mg/g amoxi- cillin-trihidrát, védett premix, BMP, granulált formában	15 mg amoxicillin/ttkg/nap, azaz 0,15 g készítmény/ttkg/nap, 15 napig Megfelel 3,0 kg/tonna keverési aránynak	24 kg	4 nap
Sulfaprex 250/50 mg/g gyógypremix sertések részére A.U.V.	Szulfadiazin 250 mg/g, Trimetoprim 50 mg/g	30 mg kombinált hatóanyag (25 mg szulfadiazin és 5 mg trimetoprim)/ttkg/nap, 5 egymást követő napon át, amely megfelel 1 g készítmény/10 ttkg/nap, vagy 2-4 kg/tonna takarmány dózisnak, 5 egymást követő napon át	25 kg	5 nap

DUNAVET
www.dunavet.hu

DUNAVET

Jobban, mint mások